Monsieur des granges chirurgien gradué a Lyon a
envoyé a lacadémie deux observations sur des contre coups
a la tête dont elle Ma chargé de luy rendre Compte
un garcon peruquier agé de 26 a 28 ans près datteindre une
soupente Elevé de dix pieds sur la quelle il montoit se coucher
tomba sur la partie Moyenne de front en gagnant un peu
le coté gauche il en fut Etourdie cependant il se releva on luy
fit prendre un peu dEau darquebusade et on laida a monter
se coucher Le lendemain il remplit ses exercices ordinaires se
fit saigner par Complaisance et continua ainsy plusieurs jours
on observa seulement quil Etoit Moin gay et quil luy coutoit
Beaucoup de se lever le matin Mr des grange informé par hazard de cet Evenement le fit entrer a lhotel dieu le 9 jour
apres sa chutte Le malade ne se plaignoit alors que de douleurs
a la region du front un peu a gauche et de pesanteur a la teste
il fut saigné et Mr carete chirurgien principal instruit de ce
qui avoit précédé le fit resaigner et fit deux heures après une
ample incision sur lendroit de la chutte, designé par le
raport du Malade et la douleur quil resentoit, on laissa Evacuer la valeur dune saigné de la Branche antérieure de larterie
temporale comprise dans lincision, Los a nud on napercut ny
fracture Ny depression La nuit suivante fut Mauvaise Le malade fut resaigne il Eut de suitte de la fievre des mouvements convulsifs perdit conoissance tomba dans Laffessement et Mourut le
3 jour apres son entrée a lhopital a louverture de la tête
on trouva La dure Mere alterée et detaché du coté gauche du
Crane on apercut La grande fente qui se propage jusqu'au
grand trou de Locciputal tel que lon lavoit dans la Base du
crane qu'a envoyé Mr des granges il ny avoit point depanchement les vesseaux des membranes et du cerveau Etoient gorgés
lauteur poursuivant ses recherches du coté droit apercut
La fracture transversal de la roche dont la pièce

fracturé Etoit contenue par la dure Mere contuse et infiltré
de Sang en cet endroit sans Epanchement particulier la
Moelle allongé paroissoit enflamé près du grand trou de locci
pital

quoique cette observation puisse entrer aisement dans la
classe de celles quÿ prouvent comme on la judicieusement dit
Sur cette Matiere quil Se rencontrera toujour des cas inaccessi
bles aux Secours de lart elle donne Neamoins un exemple
assez rare dune double contrafissure dans des points du crane
fort Eloignee de lendroit frappé et presque inferieur a la percu
ssion, cette observation assez exacte dans ces details confirme
encore quaprès des chuttes de haut sur le crane les accidents
graves peuvent estre longtems a se manifester puisque le
Malade ne se plaignoit au Neuvieme jour après Sa chutte
que de douleurs Supportables a la region du front un peu
Sur la gauche et davoir la teste lourde ce qui me fait conclu
re a conserver la Base de crane et lobservation Envoyé par
lautheur./.

un garcon imprimeur age de 22 ans tomba dans une cave
dont on avoit laissé imprudament la trappe ouverte il se
fit sur la derniere marche de pierre une plaies contuse a la partie
Moyenne de la Machoire inferieur la levre en fut decolé le mala
de Se plaignoit davoir la tête lourde et se sentoit abasourdie un
apareil convenable des Saignées frequentes furent les premiers
Secours on fut obligé dans la Suitte de faire une Contre ouverture
pour Evacuer le pus amassé Sous la levre et tout alla Bien jusqu
au 14e jour que le malade eut des frissons et de la fievre et quoique
il se fut toujour plaint de douleurs de tête profonde et de pesanteur
Sur les yeux on persista de croire une Metastase et le malade perit
le 22e jour apres Sa chutte avec delire et convulsions a louverture
du crane on trouva une fracture Sans Ecartement qui comprenoit
larcade orbitaire gauche et se propagoit jusqu'aux grandes ailes
du Sphenoide exclusivement la dure mere netoit point detaché et

loeil et ses parties environantes netoient point affectée

Mr desgranges doute avant mesme de raporter son observation de la possibilité dune contrefente ala partie anterieur du crane produitte par une chutte sur la machoire inferieur, il termine cette mesme observation par demander sil est bien vray que cette chutte ait produit la fracture trouvé apres la mort du malade je croit pouvoir repondre negativement ne voyant rien dans la disposition des parties qui puisse indiquer la plaies contuse et mesme la forte contusion de la machoire inferieure comme cause de la fracture au coronal il demande de plus si la teste na point souffert de percussion dans le trajet de la chutte je repond que cela me paroit tres probable ayant eté trouvé ala derniere marche de lescalier, aux differentes marche duquel la teste aura pu estre frappé avant darriver ala derniere cette possibilité auroit du engager a faire des recherches particulieres lorsque le 14 jour apres la chutte le malade allant bien il eut des accidents que lon attribua mal apropos a une metastase dou je conclud que cet observation ne peut estre regardé comme celle dune contrefente resultante du choque de la machoire inferieur mais bien plustost comme une preuve qu'une plaies contuse dans cette partie ne doit pas fixer seul lattention du chirurgien apres pareille chutte ce qui peut rendre lobservation interessante sous cet aspect. /.

Coste